

**FORMÜLÜ:**

Bir ölçek (5 ml); 50 mg Elementer Demir'e eşdeğer Demir III Hidroksit Polimaltoz Kompleksi (etken madde), Şeker ve Sorbitol (tatlandırıcı), Metil Paraben, Propil Paraben (koruyucu), Cream esansı (koku maddesi) içerir.

**FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:**

Ferrum Şurup demir eksikliğinin tedavi ve profilaksisi için geliştirilmiştir. Ferrum Şurup'un ağız yoluyla alınmasından sonra hızla emilen demir, hemoglobin ve myoglobin sentezinde kullanılır ya da demir depolarına nakledilir. Böylece demir yetersizliği belirtileri ortadan kalkar. Ferrum Şurup, iki değerlikli iyonize demir tuzu preparatları ile görülen diş boyanması ve ağızda metalik tad gibi istenmeyen etkilere neden olmaz.

**ENDİKASYONLARI:**

Değişik kökenli tüm demir eksiklikleri ile demir eksikliği anemisinin tedavi ve profilaksisinde; hamilelik, laktasyon ve çocukluk döneminde demir desteği tedavisinde kullanılır. Hamilelikte demir desteği ile birlikte folik asit takviyeside göz önünde bulundurulmalıdır.

**KONTRENDİKASYONLARI:**

Demir yüklenmesi (hemokromatozis, kronik hemolizis), demire karşı aşırı duyarlılık, demir kullanımı bozukluğu (kurşun anemisi, sidero-akrestik anemi) ve talasemi durumlarında kullanılmamalıdır.

**UYARILAR/ÖNLEMLER:**

Mide ülseri bulunan hastalara dikkatle verilmelidir. Oral demir preparatlarının kullanımı sırasında dışkının rengi koyulaşabilir, bu durum normal olup, herhangi bir önlem gerektirmez. Dışkıda gizli kan aranması sırasında yanığa neden olmaz. Bu nedenle bu inceleme sırasında tedavinin kesilmesine gerek yoktur.

**YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER:**

Gastrointestinal yan etkiler görülebilir.

**BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.**

**İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER:**

İki değerlikli demir içeren preparatların gıdalarla ve bazı ilaçlarla (tetrasiklin vd.) birlikte alınması halinde ortaya çıkan etkileşimlerin Ferrum Şurup'un bileşimindeki üç değerlikli demir-hidroksit polimaltoz kompleksi ile gözlenmediği bildirilmiştir.

**KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:**

Yemeklerle birlikte veya yemeklerden sonra,

Çocuklar : Günde 1-2 defa 1 ölçek (5 ml)

Yetişkinler : Günde 2-3 defa 1 ölçek (5 ml)

Meyve veya sebze suları ile karıştırılarak alınabilir.

Hekimin önereceği süre kadar kullanılmalıdır.

Demir eksikliği belirtilerinin ortadan kalkmasından sonra depoların dolması için en az bir ay daha kullanılmalıdır.

**DOZ AŞIMI:**

Aşırı miktarda alınması akut demir zehirlenmesine neden olabilir. Zehirlenme halinde Desferroksamin veya Kalsiyum Disodyum EDTA kullanılır.

Desferroksamin teratojenik etkiye sahiptir.

**SAKLAMA KOŞULLARI:**

30°C'nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

**TİCARİ ŞEKLİ:**

150 ml'lik şişelerde.

Reçete ile satılır.

**PIYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ:**

Ferrum Draje

Ferrum Fort Draje, 100 mg Fe, 350 mcg Folik asit

Ferrum Damla

Ferrum Ampul

**RUHSAT TARİHİ:** 27.9.1972

**RUHSAT NO.:** 111/43

**RUHSAT SAHİBİ:**

Fıratlar İthalat ve İhracat Ltd. Şti.

Galata-İSTANBUL

**İMAL YERİ:**

Vifor International Inc.

St. Gallen-İsviçre lisansı ile,

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Hadımköy-İSTANBUL