

hausmann

Ferrum® DAMLA

FORMÜLÜ:

1 ml (20 damla); 50 mg Elementer Demir'e eşdeğer Demir III Hidroksit Polimaltoz Kompleksi (etkin madde), Şeker (tatlandırıcı), Metil Paraben, Propil Paraben (koruyucu), Cream esansı (koku maddesi) içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER:

Ferrum Damla demir eksikliğinin tedavi ve profilaksisi için geliştirilmiştir. Ferrum Damla'nın ağız yoluyla alınmasından sonra hızla emilen demir hemoglobin ve myoglobin sentezinde kullanılır ya da demir depolarına nakledilir. Böylece demir yetersizliği belirtileri ortadan kalkar. Ferrum Damla, iki değerlikli iyonize demir tuzu preparatları ile görülen diş boyanması ve ağızda metalik tad gibi istenmeyen etkilere neden olmaz

ENDİKASYONLARI:

Değişik kökenli tüm demir eksiklikleri ile demir eksikliği anemisinin tedavi ve profilaksisinde; hamilelik, laktasyon ve çocukluk döneminde demir desteği tedavisinde kullanılır.

Hamilelikte demir desteği ile birlikte folik asit takviyesi de göz önünde bulundurulmalıdır.

KONTRENDİKASYONLARI:

Demir yüklenmesi (hemokromatozis, kronik hemolizis), demire karşı aşırı duyarlılık, demir kullanımı bozukluğu (kurşun anemisi, sidero-akrestik anemi) ve talasemi durumlarında kullanılmamalıdır.

UYARILAR / ÖNLEMLER:

Mide ülseri bulunan hastalara dikkatle verilmelidir. Oral demir preparatlarının kullanımı sırasında dışkının rengi koyulaşabilir, bu durum normal olup, herhangi bir önlem gerektirmez. Dışkıda gizli kanın aranması sırasında yanılığa neden olmaz. Bu nedenle bu inceleme sırasında tedavinin kesilmesine gerek yoktur.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER:

Gastrointestinal yan etkiler görülebilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER:

İki değerlikli demir preparatlarının gıdalarla ve bazı ilaçlarla (tetrasiklin vd.) birlikte alınması halinde ortaya çıkan etkileşimlerin Ferrum Damla'nın bileşimindeki üç değerlikli demir-hidroksit polimaltoz kompleksi ile gözlenmediği bildirilmiştir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

Yemeklerle birlikte veya yemeklerden sonra, hekim başka bir şekilde önermedikçe;

Yeni doğanlar: 1 damla (3 mg)/kg/gün

1 yaşına kadar: 5 damla/gün ile başlanır, bölünmüş dozlar halinde 20 damla/gün doza çıkarılır.

1-12 yaş arası: Günde 1-2 defa 20 damla (50-100 mg)

12 yaştan sonra: Günde 2 defa 20 damla (100 mg)

Yetişkinler: Günde 1-2 defa 40 damla (100-200 mg)

Hekimin önereceği süre kadar kullanılmalıdır.

Demir eksikliği belirtilerinin ortadan kalkmasından sonra depoların dolması için en az bir ay daha kullanılmalıdır.

DOZ AŞIMI:

Aşırı miktarda alınması akut demir zehirlenmesine neden olabilir. Zehirlenme halinde Desferroksamin veya Kalsiyum Disodyum EDTA kullanılır. Desferroksamin teratojenik etkiye sahiptir.

SAKLAMA KOŞULLARI:

30°C'nin altında, oda sıcaklığında saklayınız.

TİCARİ ŞEKLİ:

30 ml'lik şişelerde.

Reçete ile satılır.

PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ:

Ferrum Draje

Ferrum Fort Draje, 100 mg Fe, 350 mcg Folik asit

Ferrum Ampul

Ferrum Şurup

RUHSAT TARİHİ: 30.12.1985

RUHSAT NO: 137/71

RUHSAT SAHİBİ VE İMAL YERİ:

Vifor International Inc.

St. Gallen / İsviçre lisansı ile,

Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Hadımköy - İSTANBUL

111-557/12